CAPTAGIL 50 WP

CAPTAN

FUNGICIDA – FTALIMIDAS

CAPTAGIL 50 WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA: %P/P
Captan……50%
Ingredientes inertes……50%
Total……100%

Contiene: 500 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial

- **Poderoso fungicida con acción curativa y preventiva.**
- **De amplio espectro en diversas enfermedades, en una gran variedad de cultivos.**
- **Actúa directamente sobre el patógeno.**
- **Cuenta con excelente compatibilidad para el control preventivo de enfermedades fungosas.**

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Cafe **(Coffea spp)**	Antracnosis **(Colletotrichum coffeanum)**, Cercospora **(Cercospora coffeicola)**, Derrite **(Phoma costarricenses)**, Mal del talluelo **(Phytium spp)**.	3.4 - 7.0- kg/ha.
Citricos **(Citrus spp)**.	Pudrición de la raiz **(Phytophthora spp)**, Fomopsis **(Phoma spp)**.	3.0 - 5.0- kg/ha.
Fresa **(Fragaria spp)**.	Moho gris **(Botrytis cinérea)**, Pudrición del tallo **(Phytophthora cactorum)**.	3.4 - 6.0- kg/ha.
Piña **(Ananas comosus)**	Pudrición de la raiz **(Phytophthora spp)**, Pudrición del cogollo **(Phytophthora parasitica)**.	2.2 - 5.6- kg/ha.
Uva **(Vitis vinifera)**	Antracnosis **(Elsinoe veneta)**, Fomopsis **(Phoma spp)**. Mildiu polvoriento **(Uncinula necátor)**. Mildiu velloso **(Plasmopara viticola)**, Moho gris **(Botrytis cinérea)**.	2.2 - 4.5- kg/ha.
HORTALIZAS: Ajo **(Allium sativum)** Cebolla **(Allium cepa)**	Moho gris **(Botrytis cinérea)**. Mancha purpura **(Alternaria porri)**. Mildiu velloso **(Peronospora destructor)**.	3.0- 6.0 kg/ha.
Apio **(Apium graveolens)**	Tizón tardio **(Septoria apiigraveolentis)**, Tizón temprano **(Cercospora apii)**.	3.0 - 5.0 kg/ha.
CUCURBITACEAS: Melón **(Cucumis melo)** Pepino **(Cucumis sativus)** Sandia **(Citrullus vulgaris)**	Antracnosis **(Colletotrichum lagenarium)**, Mal del talluelo **(Phytium spp)**, Mildiu velloso **(Pseudoperonospora cubensis)**, Mildiu polvoriento **(Erysiphe cichoracearum)**.	2.2 - 5.0 kg/ha.
SOLANACEAS Y OTRAS HORTALIZAS: Aji **(Capsicum annuum)** Papa **(Solanum tuberosum)** Tomate **(Lycopersicon esculentum)**	Antracnosis **(Colletotrichum solani)**, Mildiu velloso **(Bremia lactucae)**, Moho gris **(Botrytis cinérea)**, Tizón tardio **(Phytophthora infestans)**, Tizón temprano **(Alternaria solani)**.	2.2 - 5.5 kg/ha.
Tabaco **(Nicotiana tabacum)**	Pudrición de la raiz **(Phytophthora spp)**, Necrosis del tallo **(Fusarium ssp)**.	3.5 - 7.0 kg/ha.

MODO DE ACCIÓN:

CAPTAGIL 50 WP: es un fungicida de uso agrícola, que actúa con propiedades curativas y preventivas contra diversas enfermedades en una gran variedad de cultivos. En la acción curativa, que es de contacto, el fungicida actúa directamente sobre el patógeno. La acción de protección, es preventiva, por lo que hay que aplicar el producto antes de que el patógeno aparezca.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
ORNAMENTALES: Begonia **(Begonia aconitifolia americana)**	Mal del talluelo **(Phytium spp)**.	2.5kg/100 gals. de agua.
Claveles **(Dianthus spp.)**	Tizón de la flor **(Alternaria dianthi)**, Mal del talluelo **(Phytium sp)**, Roya **(Uromyces dianthi)**.	2.3kg/100 gals. de agua.
Crisantemos **(Chrysanthemun morifolium)**.	Botritis **(Botrytis spp)**, Mal del talluelo **(Phytium sp)**, Mancha de la hoja **(Septoria chrysanthemi)**, Mildiu polvoriento **(Oidium chrysanthemi)**.	2.3kg/100 gals. de agua.
Gladiolo **(Gladiolus spp.)**	Pudrición **(Penicillium gladioli)**.	1.2-1.5kg/100 gals. de agua.
Rosa **(Rosa spp.)**	Botritis **(Botrytis cinérea)**, Mancha negra **(Diplocarpon rosae)**, Mildiu velloso **(Peronospora sparsa)**, Mildiu polvoriento **(Sphaerotheca pannosa)**.	1.5kg/100 gals. de agua.

En aplicaciones terrestres se debe utilizar 50 a 500 galones de agua de hectárea. En aplicaciones aéreas se debe utlizar de 10 a 50 galones de agua por hectárea.

MAXCARIBE, S.R.L.
C/Padre Fco. Guzmán No. 24, Km. 7, Gurabo
Santiago, Rep. Dom.
Tel.: 809-575-9798
Email: info@maxcaribe.com
www.maxcaribe.com