



**FUNGICIDA – ACARICIDA  
AZUFRE INORGÁNICO**

**SULTRON 72.5 SC**

COMPOSICION QUIMICA:	P/V
Azufre elemental.....	72.50%
Ingredientes inertes.....	27.50%
Total.....	100.00%

Contiene: 725 Gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial

- Mayor control de hongos y ácaros.
- Mayor actividad en multisitio.
- Floable con menor tamaño de partícula.
- Mayor protección adherencia y cobertura foliar del cultivo.
- Excelente solubilidad, no tapa boquillas.
- Muy seguro en su uso.
- Fuente nutricional de Azufre.

**SULTRON 50 SC:** Es un fungicida agrícola de origen inorgánico que actúa por contacto, además tiene acción fumigante contra algunos hongos fitopatógenos y ácaros. Controla los hongos interfiriendo con el transporte de electrones en los citocromas, también el Azufre es reducido a ácido sulfídrico, provocando bloqueo de los procesos respiratorios en los hongos y ácaros tratados.

**RECOMENDACIONES DE USO:**

CULTIVO	ENFERMEDAD	PLAGA	DOSIS
ARROZ (Oriza sativa)	Hongos del género Cercospora, Pyricularia y Helminthosporium		1-1.5 Lts/Ha con intervalos de 15 días
Leguminosas	Roya (Uromyces phaseoli) Mancha foliar (Ascochyta pisi) Mancha café (cladosporium pisicalum) Antracnosis (Colletotrichum spp) Cenicilla polvoriente (Erysiphe polygoni)	Araña roja (Tetranychus spp)	2.5-3 Lts/Ha con intervalos de 15 días
Citricos (Citrus spp)	Antracnosis (Colletotrichum gloeosporoides) Fumagina (capnodium spp) Negrilla (Phyllocoptruta oleivore) Melanosis (Diaporthe citri)	Araña roja (Pananychus citri)	500-800 CC/200 Lts de agua cuando inicien los síntomas de la enfermedad y al inicio de formación de frutos
Sandía, Melón, Pepino	Cenicilla polvoriente (Erysiphe cichoracearum) Antracnosis (colletotrichum leganarium)	Araña roja (Tetranychus bimeculate)	3-5 Lts/Ha con intervalos de 8 días
Papa, Tomate, Berenjena, Ajies	Tizón temprano (Alternaria solany) Tizón tardío (phiotpora infestans) Cenicilla polvoriente (Leveillula taurica)	Araña roja (Tetranychus spp)	3-5 Lts/ Ha. Aplique antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad y repítase cada 7 días.
Fresa	Pudrición del fruto (Botrytis cinerea) Cenicilla (Spaerotheca macularis) Mancha de la hoja (Mycosphaerella fraganae)	Araña roja (Tetranychus urticae) Araña ciciamina (Steneotarsonemus pallidus)	2.5 a 3 Lts/ha, intervalos mensuales. Antes de la fructificación 2 aplicaciones mensuales. Al ser visibles las yemas florales, asperje cada dos semanas hasta que las fresas tengan un tercio de su tamaño normal.
Aguacate, Mango	Cenicilla (Ordium sp) Antracnosis (Colletotrichum spp)	Araña roja (Oligonychus punicae)	500 -600 CC/ 200 Lts, Inicie las aplicaciones al observar los primeros síntomas y repítase cada 7-14 días
Ornamentales, Rosas	Cenicilla del rosal (Sphaerotheca pannosa)	Araña roja (Tetranychus spp)	500 -600 CC/ 200 Lts, Inicie las aplicaciones al observar los primeros síntomas y repítase cada 7-14 días



**MAXCARIBE, S.R.L.**

C/ Padre Fco. Guzmán No. 24, Km. 7

Gurabo, Santiago, Rep. Dom.

Tel. 809-575-9798

Email: info@maxcaribe.com

www.maxcaribe.com



Arysta LifeScience