FANTASMA 12,5 EC

FANTASMA 12,5 EC es un herbicida sistémico post-emergente que controla gramíneas perennes y anuales; el producto es rápidamente absorbido por las hojas y otras partes verdes de las malezas, siendo movi-vilizado a través de los tejidos de conducción (xilema y floema). Finalmente se acumula en los puntos de crecimiento, afecta los tejidos meristemáticos en los nudos de los tallos y las yemas de los rizomas, deteniendo el crecimiento. y provocando en de 8 a 15 días se produce el secado total de la maleza.

ACCIÓN FITOSANITARIA: Herbicida

INGREDIENTE ACTIVO: Fluazifop – p – Butyl

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:
Concentrado emulsificable al 12,5%

FITOTOXICIDAD: En cultivos de hoja ancha es total-mente selectivo. Es nocivo o letal para todas las plantas gramíneas.

COMPATIBILIDAD: No es compatible con herbici-das hormonales, se recomienda aplicar solo.

TOXICOLOGÍA:

Categoría toxicológica: IV

Oral DL50: Oral agudal: rata macho: 3 680 mg/kg; rata hembra: 2451 mg/kg; ratón macho: 1 600 mg/kg, raton hembra: 1 900 mg/kg; cobaya macho: 2 659 mg/kg; conejo: 621 mg/kg.

Dérmica y ocular DL50: Subcutánea aguda: rata: >6 050 mg/kg; conejo: >2 000 mg/kg. Irritante ligero para la piel y ojos (conejos). No es un sensibilizador de la pieL (cobayas).

Inhalación CL50: rata: >5 240 mg/m3/4h.

Póngase el equipo de protección personal, antes de usar y manipular FANTASMA 12,5 EC . Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con la solución. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora, debe utilizar un tazón medidor. De acuerdo con la dosis de FANTASMA 12,5 EC a utilizar, mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad; seguidamente complete el volumen de agua requerido. Agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Aspersora de mochila o equipo accionado por tractor o avión. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de aplicar FANTASMA 12,5 EC, calibre el equipo terrestre con agua para verificar que está aplicando la dosis correcta. Con equipo terrestre se recomienda usar boquillas de abanico TJ 8001- 8002 o su equivalente.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Se debe esperar 24 horas o después de que el producto se haya secado en el follaje de la maleza tratada tratada, o utilizar el equipo de protección personal completo.

MAXCARIBE, SRL
Calle Padre Fco. Guzmán No. 24
Km. 7, Gurabo, Stgo., Rep. Dom.
Tel.: 809-575-9798
www.maxcaribe.com

RIMAC® La mejor calidad Siempre

USOS RECOMENDADOS EN:			
Soya	Glycine max	Tomate	Lycopersicom esculentum
Maní	Arachis hypogaea	Repollo	Brassica oleracea var capitata
Café	Coffea ssp	Frijol	Phaseolus spp
Cebolla	Allium cepa	Cítricos	Citrus spp
Ajo	Allium sativum	Caña de azúcar	Saccharum officinarum
Melón	Cucumis melo	Palma africana	Elaeis guineensis
Pepino	Cucumis sativus	Piña	Ananas comosus
Sandía	Citrullus vulgaris		

RECOMENDACIONES DE USO:		
CULTIVOs	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS
Algodón Gossypium spp Soya Glycine max Cebolla Allium cepa Batata Ipomoea batatas Papa Solanum tuberosum Zanahoria Daucus carota Macadamia Macadamia integrifolia Melocotón Prunus spp Durazno Prunas persica	Bermuda Cynodon dactylon Zalea Digitaria spp Pará Panicum spp Arrocillo Echinochloa spp Cola de Zorro Setaria spp Pata de gallina Eleusine indica Mozote Cenchrus spp Plumilla Leptochloa filiformis Zacate de leche Ixophorus unisetus Kikuyo Pennisetum spp Grama Paspalum conjugatum Caminadora Rottboellia exaltata Zacate Johnson Sorghum halepense Avena Loca Avena fatua Brachiaria Brachiaria spp	A una dosis de 1 -1,4 Lt/ha en un volumen de agua de 200 a 400 L. Se recomienda asperjar cuando las malezas gramíneas estén en pleno desarrollo o tengan de 2-4 hojas verdaderas, o entre 4-6 centímetros de altura, lo que ocurre generalmente 15 ó 25 días después de la siembra o trasplante.
Palma aceitera Elaeis guineensis	Zalea Digitaria spp Grama Paspalum spp Pata de gallina Eleusine indica Arrocillo Echinochloa sp Caminadora Rottboellia exaltata Arrocillo Oryza spp	0,75 -1 Lt/ha, en aplicación post emergente a la maleza cuando éstas tengan de 2-4 hojas verdaderas, utilizando un volumen de agua de 60 Lt/ha con una boquilla 8001
Piña Ananas comosus	Caminadora Rottboellia cochinch nensis Arrocillo Echinochloa sp Zalea Digitaria sanguinalis Pata de gallina Eleusine indica Gamalote Paspalum fasciculatum Zacate guinea Panicum maximum	1,7 - 1,8 Lt/ha, en aplicación cuando las malezas tengan de 2-4 hojas verdaderas. Utilizar un volumen de agua de 750 Lt/ha.
Papaya Carica papaya Banano Musa AAA	Caminadora Rottboellia cochinchinensis Arrocillo Echinochloa sp Zalea Digitaria sanguinalis Pata de gallina Eleusine indica Gamalote Paspalum fasciculatum Zacate guinea Panicum maximum	1,62 - 2,0 Lt/ha, en aplicación post-emergente a la maleza cuando éstas tengan de 2-4 hojas verdaderas, utilizando para papaya un volumen de agua de185 Lt/ha y para banano 210 Lt/ha

USOS RECOMENDADOS EN:	
Frijol Phaseolus vulgaris Caña de azúcar Saccharum officinarum	Pata de gallina Eleusine indica Zalea Digitaria sp

DOSIS RECOMENDADAS:
Para Frijol: 1,0 - 1,5 Lt/ha.
Como madurador de caña: Utilice 0,4 a 0,6 litros por hectárea en 26 litros por hectárea de mezcla en aplicaciones aéreas. Una sola aplicación 4-6 semanas antes del corte.