RIMAXATO 35,6 SL

Rimaxato 35,6 SL es un herbicida sistémico, no selectivo de amplio espectro. Penetra a través del follaje o partes verdes de la planta. Translocándose vía floema hacia los puntos de crecimiento o tejido meristemático de la planta. Es un producto que no persiste en el suelo y por ende no presenta efecto preemergente. Su acción es directamente en la inhibición de los aminoácidos aromáticos. Para un mejor efecto de control, debe aplicarse cuando las malezas estén metabólicamente activas (15 a 30 cm de altura).

ACCIÓN FITOSANITARIA: Herbicida.

INGREDIENTE ACTIVO: Glifosato.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Concentrado Soluble al 35,6 %

COMPATIBILIDAD: Puede mezclarse con otros herbicidas de RIMAC como Aliado 60 WP, Rimaxil 60 SL, Guerrero 24 EC. Para realizar mezclas es preferible con formulaciones de líquidos solubles o concentrados emulsificables. No se recomienda la mezcla con herbicidas de contacto, ni com - puestos alcalinos. Se recomienda siempre realizar pruebas previas de compatibilidad, en pequeña escala.

TOXICOLOGÍA:

Categoría toxicológica: IV

Oral DL50: rata: 5 600 mg/kg

Dérmica y ocular DL50: Subcutánea aguda para conejos: >5 000 mg/kg. Irritante para los ojos; no es irritante para la piel (conejos).

MAXCARIBE, SRL
Calle Padre Fco. Guzmán No. 24
Km. 7, Gurabo, Stgo., Rep. Dom.
Tel.: 809-575-9798
www.maxcaribe.com

Para preparar el caldo final de aplicación llenar el tanque hasta la mitad con agua, agregue la dosis de Rimaxato 35,6 SL, poniendo el sistema de aplicación de agitación o recirculación a funcionar, termine de llenar con agua limpia, mantenga siempre en agitación la mezcla.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Revise que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Se puede aplicar por vía terrestre con bomba de espalda manual o equipo terrestre acoplado a un tractor. Se deben de utilizar boquillas de abanico plano. Para aplicaciones terrestres los volúmenes oscilan de 60 a 600 L/Ha. Para aplicaciones aéreas (arroz y caña de azúcar) pueden utilizarse volúmenes de 25 a 50 L/ha con gotas grandes (300 a 500 micras). Después de cada aplicación, los utensilios usados en la mezcla y los equipos de aplicación deben lavarse en forma adecuada. El producto no ejerce acción química sobre el equipo de aplicación. Para la mezcla, aplicación del producto y lavado del equipo de aplicación debe utilizarse: Guantes, sombrero, botas de hule, mascarilla, camisa manga larga y pantalón largo.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA

Recomendable esperar 24 horas para realizar el ingreso, de hacerlo antes, debe utilizar el equipo de protección personal completo.

RIMAC®
La mejor calidad Siempre

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN:

CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS L/Ha
Cultivos Perennes (Aplicación dirigida)	Malezas que se reproducen por semilla	Cultivos perennes
Café: Coffea arabica	Caminadora Rottboellia cochin-chinensis	Café Coffea arabica 1-3 L/ha
Cítricos: Citrus spp	Alambrillo Digitaria sanguinalis	Cítricos Citrus spp 1-3 L/ha
Palma aceitera: Elaeis guineensis	Zacate Honduras Ixophorus spp	Palma aceitera Elaeis guineensis 1-3 L/ha
Aguacate: Persea americana	Mozote Cenchrus echinatus	Aguacate Persea americana 1-3 L/ha
Macadamia: Macadamia spp	Mielcilla Galinsoga spp	Macadamia Macadamia spp 1-3 L/ha
Banano y Plátano: Musa AAA y AAB	Cinquillo Drymaria cordata	Banano y Plátano Musa AAA y AAB 1-3 L/ha
Mango: Mangifera indica	Bledo Amaranthus spp	Mango Mangifera indica 1-3 L/ha
Áreas No agrícolas	Pata de gallina Eleusine indica	
	Cabezona Paspalum virgatum	Cultivos anuales
Melón: Cucumis melo	Zacate amargo Paspalum conju - gatum	Melón Cucumis melo 3-4 L/ha
Caña de Azúcar: Saccharum officinarum	Siempre viva Commelina spp	Caña de Azúcar: Saccharum officinarum 3-4 L/ha 3.5 L/ha en aplicación aérea
Piña: Ananas comosus	Santa Lucía Ageratum conyzoides	Piña Ananas comosus 3-4 L/ha
Maíz: Zea Mays	Moriseco Bidens pilosa	Maíz Zea mays 3-4 L/ha
Sorgo: Sorghum bicolor	Gamalote Paspalum fasciculatum	Sorgo Sorghum bicolor 3-4 L/ha
Arroz: Oryza sativa	Hierba mora Solanum nigrum	Arroz Oryza sativa 3-4 L/ha 3.5 L/ha en aplicación aérea
Papa: Solanum tuberosum	Churristate Ipomoea spp	Papa Solanum tuberosum 3-4 L/ha
Otros usos	Cerrajilla Sonchus oleraceus Clavelillo Emilia sonchifolia Coyolillo Cyperus rotundus	