



OXATE 24 SL

INSECTICIDA NEMATICIDA



BENEFICIOS DE USAR OXATE 24 SL

- ✓ Insecticida - Nematicida con una excelente penetración en la planta.
- ✓ Posee un efecto letal sobre la plaga , provocándole la muerte rápidamente.
- ✓ De acción prolongada en el cultivo.
- ✓ Produce un efecto FITOTÓNICO.
- ✓ Previene la pérdida del sistema radicular de la planta.
- ✓ De acción sistémica doble ya que se mueve hacia las partes de arriba de la planta y hacia las raíces (acropetal y basipetal)''



BioQuim
Mejores Cosechas...




MAXCARIBE
TU MEJOR COSECHA

C/Padre Fco. Guzmán No. 24, Km. 7
Gurabo, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: 809-575-9798
email: info@maxcaribe.com
www.maxcaribe.com

FERQUIDO

De sus cosechas: *El mejor amigo...Siempre!!!*



OXATE 24 SL

INSECTICIDA NEMATICIDA

OXATE 24 SL: Es un insecticida nematocida que se aplica al suelo o al follaje para el control de: Nemátodos, insectos chupadores y algunos ácaros que afectan una gran variedad de cultivos.

Es absorbido por las raíces y el follaje (acción sistémica) se trasloca en forma ambimóvil (floema-xilema) a los puntos de mayor actividad meristemática.

Se degrada arápidamente en gas carbónico, agua y amoníaco; no afecta a predadores y abejas una vez que el rocío de la aplicación se ha secado sobre el follaje. Se puede aplicar al suelo, al follaje o inyectado.


Es compatible con la mayoría de productos agrícolas, por lo que se puede utilizar en mezclas de tanque con otros agroquímicos; excepto con Arseniato de Calcio e insecticidas clorinados.

Es recomendable hacer pruebas de compatibilidad, antes de mezclar.

Plagas y Dosis por cultivo de OXATE 24 SL

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	CULTIVO	PLAGAS	DOSIS
	Sogata/Oebalus Nemátodos Ácaros Tetránicos	Aplicación Foliar: 1 - 2.5 lt/ha.		Nemátodos: <i>Pratylenchus spp.</i> <i>Rotylenchulus spp.</i> Acaros: <i>Tetranychus urticae</i>	Tratamiento Pre-Plantación 8-12 lt/ha. Aplicación total al suelo una semana antes del trasplante. Aplicación foliar 2-6 lt/ha. Intervalo entre a plicaciones: 4 semanas
	Nemátodos: <i>Rhadopholus similis</i> <i>Helicotylenchus spp.</i> <i>Meloidogyne spp.</i> <i>Rotylenchulus spp.</i> <i>Pratylenchus spp.</i>	Inmersión de rizomas: en 0.5 - 1.0 lt/200 lts. de agua Sumergir la parte basal durante 20 mins. Aplicación directa: de 5 - 10 cc por planta directo a la base del pseudo tallo o inyectado.		Afidos Mosca Blanca Nemátodos Thrips	Aplicación Foliar: 1.5 - 2.5 lt/ha.
	Nemátodos: <i>Meloidogyne spp.</i> <i>Pratylenchus spp.</i>	Aplicación Foliar: 2.5 lt/ha.		Afidos Mosca Blanca Nemátodos Thrips	Aplicación Foliar: 1.5 - 2.5 lt/ha.
	Acaros: <i>Tetranychus urticae</i> Thrips: <i>Thris spp.</i>	Aplicación Foliar: 2.5 lt/ha.		Minador de la hoja: <i>Liriomyza spp.</i> Thrips: <i>Thris spp.</i>	Aplicación en semillero o trasplante 2.5 lt/ha.

Tiempo de reingreso: 24 horas / Intervalo entre la última aplicación y la cosecha: Café y Piña, Ají 7 días / Apio 3 días, Ornamentales, Banano y Plátanos; no hay restricción.



BioQuim
Mejores Cosechas...



MAXCARIBE
TU MEJOR COSECHA
C/Padre Dco. Guzmán No. 24, Km. 7
Gurabo, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: 809-575-9798
email: info@maxcaribe.com
www.maxcaribe.com

FERQUIDO
De sus cosechas: **El mejor amigo...Siempre!!!**